

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami hantarkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Buletin Informasi Meteorologi yang merupakan produk publikasi dari Stasiun Meteorologi Klas III Umu Mehang Kunda Sumba Timur ini pada akhirnya dapat terbit. “Informasi Meteorologi” yang disajikan dalam buletin ini merupakan data hasil pengamatan parameter – parameter cuaca (meliputi : Suhu Udara, Tekanan Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, Penyinaran Matahari dan Angin) dan fenomena cuaca lainnya yang terjadi serta Pelayanan Umum yang dilakukan sepanjang bulan Oktober 2018 Stasiun Meteorologi Klas III Umu Mehang Kunda Sumba Timur.

Saya ucapkan Terima Kasih bagi seluruh Pegawai Stasiun Meteorologi Klas III Umu Mehang Kunda Sumba Timur yang telah bekerja dengan baik, penuh disiplin, dedikasi dan tanggung jawab sehingga Buletin dapat terbit.

Harapan kami, semoga Buletin Meteorologi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan acuan bagi para pembaca khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sumba Timur dan masyarakat umum diluar Kabupaten Sumba Timur yang kami sajikan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupaun tampilan, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan kedepan,

Semoga buletin ini bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Waingapu, 05 Nopember 2018  
Kepala Stasiun Meteorologi  
Umu Mehang Kunda Sumba Timur

Elias Lambertus Lima Helu  
NIP.196307231988121001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN.....	3
DINAMIKA ATMOSFER .....	4
ANALISA DINAMIKA ATMOSFER BULAN OKTOBER2018 .....	5
PRAKIRAAN CURAH HUJAN.....	7
I. SUHU UDARA	
1.1. SUHU UDARA PERMUKAAN HARIAN.....	8
1.2 SUHU UDARA MAXIMUM HARIAN.....	9
1.3 SUHU UDARA MINIMUM HARIAN .....	10
II. TEKANAN	
UDARA.....	11
TEKANAN UDARA DIATAS PERMUKAAN LAUT.....	12
TEKANAN UDARA DIATAS PERMUKAAN DARAT.....	13
III. CURAH	
HUJAN.....	14
IV. KELEMBABAN	
UDARA.....	15
GRAFIK KELEMBABAN UDARA.....	16
V. PENGUAPAN.....	17
GRAFIK PENGUAPAN.....	18
VI. PENYINARAN	
MATAHARI.....	19
GRAFIK PENYINARAN MATAHARI.....	20
VII. ANGIN.....	21
ANEMOMETER.....	22

WINDROSE.....	23
INFORMASI PELAYANAN UMUM.....	24
LAPORAN PRODUK METEOROLOGI PUBLIK.....	25
INFORMASI CUACA BERMAKNA.....	26
SERBA SERBI METEOROLOGI.....	35

## PENDAHULUAN

Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca dan iklim. Cuaca diartikan sebagai keadaan atmosfer yang terbentuk oleh adanya proses pertukaran sifat antar bagian atmosfer serta antar atmosfer dan lingkungannya yang terjadi pada suatu daerah dengan cakupan wilayah yang terbatas (sempit ) dan waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan keadaan atmosfer yang terjadi pada suatu daerah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama. Meteorologi berkembang dari negara – negara maju yang pada umumnya terletak di daerah subtropis dengan 4 ( empat ) musim diantaranya: musim panas (summer ), musim gugur (autumn ), musim dingin (winter ), musim semi (spring ).

Meteorologi Indonesia tidak mengenal 4 (empat ) musim seperti yang disebutkan di atas karena letak secara Geografis pada daerah Equator atau lintang rendah. Sehingga wilayah Indonesia mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri di bandingkan dengan daerah – daerah yang lain. Indonesia hanya mempunyai 2 (dua ) musim yaitu : musim hujan (reany season) dan musim kering (dry season ).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor : KEP.03 Tahun 2009 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2008 tentang BMKG, dimana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden. BMKG melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara dan Geofisika.

## **DINAMIKA ATMOSFER**

### **1. El-Nino dan La-Nina**

El-Nino merupakan fenomena iklim global dari sistem interaksi lautan atmosfer yang ditandai memanasnya suhu muka laut di Ekuator Pasifik Tengah (Nino 3.4) atau anomali suhu muka laut di daerah tersebut positif (lebih panas dari rata-rata). Sementara, sejauh mana dampak El Nino pada iklim di Indonesia, sangat tergantung dengan kondisi perairan di wilayah Indonesia. Fenomena El Nino yang berpengaruh di wilayah Indonesia diikuti dengan berkurangnya curah hujan secara drastis, baru akan terjadi bila suhu perairan Indonesia lebih dingin dari kondisi normalnya. Namun jika kondisi perairan Indonesia cukup hangat, maka tidak berpengaruh pada kurangnya curah hujan secara signifikan di Indonesia. Disamping itu, mengingat luasnya wilayah Indonesia, tidak seluruh wilayah Indonesia terdampak El Nino.

Sedangkan La Nina merupakan kebalikan dari El Nino ditandai dengan anomali suhu muka laut negatif (lebih dingin dari rata-rata) di Ekuator Pasifik Tengah (Nino 3,4). Fenomena La Nina secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat bila dibarengi dengan menghangatnya suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia. Demikian El Nino, La Nina juga tidak berdampak ke seluruh wilayah Indonesia.

### **2. Dipole Mode**

Dipole Mode merupakan fenomena interaksi laut-atmosfer di Samudra Hindia yang dihitung berdasarkan perbedaan nilai (selisih) antara anomali suhu muka laut perairan pantai timur Afrika dan perairan di sebelah barat Sumatera. Perbedaan anomali suhu muka laut dimaksud disebut sebagai Dipole Mode Indeks (DMI).

Untuk DMI positif, umumnya berdampak berkurangnya curah hujan di Indonesia bagian barat, sedangkan nilai DMI negatif, secara umum berdampak meningkatnya curah hujan di Indonesia bagian barat.


### ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER BULAN FEBRUARI 2018

Hal-hal analisis di sini meliputi analisa terhadap perkembangan ENSO ,SOI dan Aliran Masa Udara di Indonesia.

#### a. Perkembangan ENSO


##### ENSO pada bulan Oktober 2018

Kondisi ENSO berada pada kondisi normal sehingga pengaruhnya tidak signifikan terhadap hujan harian di wilayah indonesia.



### b. SOI Bernilai Positif


tekanan udara di wilayah Pasifik (Tahiti) lebih rendah dibandingkan Australia (Darwin) terdapat Penambahan suply uap air dari Samudra Pasifik ke Indonesia.




### c. Pola aliran masa Udara Lapisan 850 mb

Aliran massa udara, seluruh wilayah Indonesia didominasi **angin Timuran** (udara Kering).

Angin 850mb Dasarian III Agustus 2018




Pada umumnya di sumba di perkirakan curah hujan bulan Oktober 2018 yaitu sekitar 20-50 mm.





Untuk sifat hujan bulan Oktober 2018 di Sumba di perkirakan pada umumnya di Normal dari rata-ratanya yaitu 31-50%



## PENGERTIAN

### A. Provisional Normal Unsur Iklim

Yaitu nilai rata – rata unsur iklim masing – masing bulan dengan periode waktu yang ditentukan secara bebas disyaratkan minimal 10 tahun.

### B. Sifat Unsur Iklim

Yaitu perbandingan antara rata – rata ataupun akumulasi unsur iklim yang terjadi selama satu bulan dengan nilai normal unsur iklim bulanan disuatu tempat.

Sifat unsur iklim menjadi 3 kategori :


- a. **Diatas Normal (AN)** : Jika lebih besar dari normal bulanan ditambah standar deviasi atau lebih besar dari 115 % terhadap nilai normal bulanan untuk unsur curah hujan.
- b. **Normal (N)** : jika diantara nilai normal bulanan di tambah standar deviasi ataupun di kurang standar deviasi atau di antara 85% ataupun 115% terhadap nilai normal bulanan untuk unsur curah hujan.

- c. **Di bawah normal ( BN )** : jika kurang dari nilai normal bulanan di kurang standar deviasi atau kurang dari 85% terhadap nilai normal bulanan untuk unsur curah hujan.

### C. Curah Hujan

1. Rata – rata curah hujan bulanan :  
Nilai rata – rata curah hujan masing – masing bulan dengan periode minimal 10 tahun.
2. Normal curah hujan bulanan :  
Nilai rata – rata curah hujan masing – masing bulan selama periode 30 tahun.
3. Standar normal curah hujan bulanan :  
Nilai rata – rata curah hujan masing – masing bulan selama periode 30 tahun dimulai dari:
  - 1 Oktober1901 s.d. 31 Oktober1930
  - 1 Oktober1931 s.d. 31 Oktober1960
  - 1 Oktober1961 s.d 31 Oktober1990
  - 1 Oktober1991 s.d 31 Oktober2020

Berikut grafik rata-rata curah hujan stasiun meteorologi Umbu Mehang Kunda Sumba Timur tahun 1973 s.d 2015



## ANALISA UNSUR-UNSUR CUACA DI STASIUN METEOROLOGI UMBU MEHANG KUNDA SUMBA TIMUR BULAN OKTOBER 2018

### I. SUHU UDARA (°C)

#### I.1. SUHU UDARA PERMUKAAN HARIAN

- **Definisi**


Suhu adalah jumlah fisik yang mencirikan rata – rata gerakan acak dari molekul – molekul pada benda fisik (WMO, 2006). Suhu udara permukaan yang diukur pada ketinggian 1.20 – 1.25 m dari permukaan tanah (BMG,2006). Suhu udara didefinisikan sebagai keadaan panas pada suatu benda atau bidang dan atau luasan pada suatu saat dan waktu. Faktor utama yang menjadi penyebab adanya suhu udara adalah sinar matahari terhadap benda/bidang atau luasan tertentu. Faktor lain yang menjadi penyebab tinggi rendahnya suhu udara adalah sifat benda/bidang, luasan tertentu seperti sifat memantul dan menyerap sinar matahari.

- Satuan

Suhu udara permukaan dinyatakan dalam derajat celcius ( $^{\circ}\text{C}$ )



- Alat Ukur

Untuk mengukur suhu udara permukaan dipergunakan Thermometer. Suhu udara permukaan diamatai dengan menggunakan Thermometer Bola Kering.



Gambar Thermometer

- **Grafik Suhu Udara Permukaan**



- **Keterangan**

Dalam bulan Oktober 2018 suhu udara harian di stasiun Meteorologi Umu Mehang Kunda dan sekitarnya berkisar 22.0 °C sampai 35.0 °C. Dengan suhu

udara rata – rata bulan Oktober 2018 adalah 28.0°C . Suhu udara rata – rata tertinggi yaitu 28.8 °C yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2018. Sedangkan suhu udara rata –rata terendah yaitu 27.0°C yang terjadi pada tanggal 08 Oktober 2018.

## **I.2. SUHU UDARA MAXIMUM HARIAN**

- **Definisi**

Suhu Udara Maximum adalah suhu udara tertinggi yang diamati dan dicatat, yang terjadi pada hari itu. Suhu udara maximum diamati sekali dalam satu hari. Untuk suhu udara maksimum hari ini diamatai pada hari ini juga,pada jam 12.00 UTC (20.00 WITA).



- **Satuan**

Suhu udara maximum dinyatakan dalam derajat celcius (°C).

- **Alat Ukur**

Untuk mengukur suhu udara maximum dipergunakan Thermometer Maximum.

- **Grafik Suhu Udara Maksimum**



- **Keterangan**





Suhu udara maksimum harian rata – rata bulan Oktober 2018 adalah 33,1 °C. Dengan suhu udara maksimum tertinggi adalah 35,0°C yang terjadi pada tanggal 06 Oktober 2018.

### 1.3. SUHU UDARA MINIMUM HARIAN

#### ▪ Definisi

Suhu Udara Minimum adalah suhu udara terendah yang diamati dan dicatat, yang terjadi pada hari itu. Suhu udara minimum diamati sekali dalam satu hari yaitu jam 00.00 UTC (08.00WITA)


#### ▪ Satuan

Suhu udara minimum dinyatakan dalam derajat celcius (°C).

#### ▪ Alat Ukur

Untuk mengukur suhu udara minimum dipergunakan Thermometer Minimum.

#### ▪ Grafik Suhu Udara Minimum



#### ▪ Keterangan



Suhu udara minimum harian rata – rata bulan Oktober 2018 adalah 21.9 °C. Dengan suhu udara minimum harian terendah adalah 20,0 °C yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2018.

## **II. TEKANAN UDARA (mb)**

- **Definisi**

Tekanan udara adalah gaya persatuan luas yang disebabkan oleh berat udara di atasnya ( BMG. 2006).

- **Satuan**

Tekanan udara dinyatakan dalam satuan milibar (mb)


1 milibar (mb) = 1 hektopascal (hPa)

- **Alat Ukur**

Untuk mengukur tekanan udara dipergunakan Barometer. Barometer yang di pergunakan digunakan di Stasiun Meteorologi Umu Meheng Kunda Sumba Timur adalah Barometer Air Raksa dan Barometer Digital. Alat Perekam tekanan udara disebut Barograf.



Gambar Barometer



Gambar Barograph


Berdasarkan data hasil pengamatan tekanan udara ,tekanan udara dipisahkan jadi 2 bagian diantaranya :

### 1. **TEKANAN UDARA DIATAS PERMUKAAN LAUT**

Selama bulan Oktober 2018, tercatat bahwa tekanan udara diatas permukaan laut untuk wilayah Sumba Timur dan sekitarnya berkisar antara 1007.0 mb sampai dengan 1017.0 mb. Dengan rata – rata tekanan udara adalah 1011.8 mb.

Sedangkan tekanan udara harian rata – rata tertinggi adalah 1016.0 mb yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 2018 dan tekanan udara rata-rata terendah adalah 1009.8 mb yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018.

#### **Grafik Tekanan Udara Permukaan Laut**



**2. TEKINAN UDARA DI ATAS PERMUKAAN DARAT**



Selama bulan Oktober 2018, tercatat bahwa tekanan udara di atas permukaan darat untuk Wilayah Sumba Timur dan sekitarnya berkisar antara 1006.0 mb sampai dengan 1015.0 mb. Dengan rata – rata tekanan udara adalah 1010.7 mb.

Sedangkan tekanan udara harian rata – rata tertinggi adalah 1014.8 mb yang terjadi pada tanggal 02 Oktober 2018 dan tekanan udara rata – rata terendah adalah 1008.6 mb yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018.

Adapun grafik tekanan udara di atas permukaan darat harian rata – rata.

**Grafik Tekanan Udara Permukaan Darat**





### III. CURAH HUJAN (mm)

- **Definisi**

Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, dengan asumsi tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir (BMKG, 2009).

Hujan merupakan satu bentuk presipitasi (endapan) yang berwujud cairan. Presipitasi sendiri dapat berwujud padat (misalnya : salju dan hujan es) atau aerosol ( seperti embun dan kabut). Hujan terbentuk apabila titik air yang

terpisah jatuh ke bumi dari awan. Tidak semua hujan sampai ke permukaan bumi karena sebagian menguap ketika jatuh melalui udara kering. Hujan jenis ini disebut **Virga**, yaitu tetes air ( hujan ) atau es yang jatuh dari atmosfer tetapi tidak sampai ke permukaan tanah.

- Satuan  
Curah hujan dinyatakan dalam milimeter ( mm )
- Alat  
Alat yang dipergunakan adalah penakar hujan biasa ( tipe Obs ) dan penakar hujan type Helman.





Gambar Penakar Hujan Type Obs



Gambar Penakar Hujan Type Helman

- **Grafik Curah Hujan**



- Keterangan

Curah hujan selama bulan Oktober tahun 2018 6.0 mm

#### IV. KELEMBABAN UDARA

- **Definisi**

Lembab nisbi atau kelembaban relatif adalah perbandingan antara massa uap air yang ada di dalam satu satuan volume dengan massa uap air yang diperlukan untuk menjenuhkan satu satuan volume udara tersebut pada suhu yang sama (BMKG, 2006).

- **Satuan**

Lembab nisbi dinyatakan dalam persen ( % ).

- **Alat**



Alat yang di pergunakan untuk menentukan lembab nisbi adalah Screen Psycrometer/ Psychrometer Sangkar Tetap ( Thermometer Bola Kering dan Thermometer Bola Basah ) dan Thermohygrograph.

- **Grafik Kelembaban Udara**



BMKG





• **Keterangan**

Dalam bulan Oktober 2018 kelembaban udara harian rata – rata di Stasiun Meteorologi Umu Mehang Kunda Sumba Timur dan sekitarnya berkisar antara 61% sampai dengan 77%. Dengan kelembaban udara rata – rata bulan Oktober 2018 adalah 72%.

**V. PENGUAPAN**



- **Definisi**

Penguapan atau evaporasi adalah jumlah air yang menguap dari permukaan air yang terbuka atau dari tanah ( **WMO, 2006** ). Untuk menghitung jumlah penguapan yang ada maka dapat di peroleh dari jumlah selisih tinggi air hari kemarin dengan hari ini di tambah jumlah curah hujan. Pengukuran jumlah penguapan di lakukan satu kali dalam satu hari pada jam 00.00 UTC.

- **Satuan**

Penguapan dinyatakan dalam milimeter ( mm ).


- **Alat**

Alat yang digunakan untuk mengukur penguapan adalah panci penguapan terbuka ( Open Pan Evaporimeter).



Gambar Panci Penguapan

- **Grafik Penguapan**



- **Keterangan**

Akumulasi penguapan selama bulan Oktober 2018 adalah 170 mm. Penguapan terbesar terjadi pada tanggal 13 Oktober 2018 yaitu sebesar 9.8 mm.

## VI. PENYINARAN MATAHARI



- **Definisi**

Penyinaran matahari yang diamati di bedakan dalam dua jenis yaitu meliputi lamanya penyinaran matahari ( durasi penyinaran matahari ) dan intensitas radiasi matahari. Durasi penyinaran matahari selama periode tertentu adalah jumlah pada periode itu untuk pemancaran radiasi matahari melampaui  $120 \text{ W m}^{-2}$  ( **WMO, 2006** ). Sedangkan intensitas radiasi matahari adalah besarnya energi yang di pancarkan oleh matahari per satuan waktu.

- **Satuan**

Satuan untuk menyatakan durasi penyinaran matahari dinyatakan dalam persen ( % ) dan jam. Untuk satuan dalam persen ( % ) digunakan untuk kepentingan klimatologi dan satuan dalam jam digunakan untuk kepentingan meteorologi. Sedangkan satuan untuk menyatakan intensitas radiasi matahari dinyatakan dalam  $\text{Watt/ m}^2$ .



- **Alat**

Untuk mengukur durasi penyinaran matahari dipergunakan Campbell Stokes ( Sun Shine Recorder ) dan untuk mengukur intensitas radiasi matahari dipergunakan Solarimeter.



Gambar Campbell Stokes

- **Grafik Penyinaran Matahari**



- Keterangan**

Lamanya penyinaran matahari rata – rata pada bulan Oktober 2018 adalah 97%. Dengan lamanya penyinaran tertinggi terbesar 100%. Pada bulan Oktober 2018 penyinaran terendah pada tanggal 26 Oktober 2018 yaitu sebesar 84 %

## VII. ANGIN



- **Definisi**

Angin adalah udara yang bergerak horizontal terhadap permukaan bumi (**United Kingdom Civil Aviation Authority, 2001** ).

Arah angin adalah arah dari mana datangnya angin bertiup (**BMG, 2006** ).

Kecepatan angin adalah jumlah vector tiga dimensi dengan fluktuasi skala kecil yang acak pada ruang dan waktu yang berpadu pada aliran skala besar yang teratur (**WMO, 2006** ).

Adapun arah dan kecepatan angin permukaan diukur pada ketinggian 10 m dari permukaan tanah (**BMG, 2006** ).

- **Satuan**

Arah angin dalam satuan derajat yang di ukur searah jarum jam mulai dari titik utara yang sebenarnya ( true north ).

Kecepatan angin dinyatakan dalam Knot (KT).

1 Knot = 1.85 km/jam.

- **Alat**


Untuk mengukur arah dan kecepatan angin dipergunakan Anemometer.



Gambar Anemometer

- **Arah dan Kecepatan Angin Bulan Oktober 2018**





Arah angin terbanyak pada bulan Oktober 2018 adalah dari Timur laut dengan kecepatan rata – rata mencapai 10 knot. Dengan angin kecepatan maksimum adalah 22 knot dengan arah 090°

## PELAYANAN UMUM

### I. PELAYANAN PENERBANGAN

Berdasarkan hasil data pengamatan cuaca selama bulan Oktober 2018, dalam hal ini banyak hasil observasi cuaca khusus untuk pelayanan penerbangan yang berupa QAM, SPECI, METAR dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini.

**Tabel : Informasi Pelayanan Meteorologi Untuk penerbangan  
Stasiun Meteorologi Umu Mehang Kunda Sumba Timur Bulan Oktober 2018**

BULAN	HASIL PENGAMATAN		
	QAM	SPECI	METAR
Oktober 2018	318	2	720

Keterangan :

- QAM : merupakan informasi cuaca yang diberikan untuk kepentingan *Take Off ( Lepas Landas )* dan *Landing ( Pendaratan )* pesawat terbang.
- SPESI : Merupakan informasi cuaca khusus yang harus dilaporkan setiap terjadi perubahan cuaca yang signifikan (bermakna) seperti : terjadi thunderstorm (badai guntur ), terjadi hujan, terjadi perubahan arah kecepatan angin secara tiba – tiba dan lain – lain. Informasi ini dilaporkan saat keadaan cuaca mulai terjadi dan setelah cuaca selesai terjadi.
- METAR : Merupakan informasi cuaca rutin untuk kepentingan penerbangan yang di buat setiap jam atau ½ jam sekali pada jam penuh atau jam tengahan.



## II. LAPORAN PRODUK METEOROLOGI PUBLIK

Laporan produk meteorologi publik merupakan laporan informasi mengenai kegiatan publikasi data – data hasil pengamatan yang di gunakan atau dimanfaatkan oleh BMKG, instansi di luar BMKG dan masyarakat umum yang membutuhkan. Hasil produk meteorologi publik dapat di lihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel.Laporan Produk Meteorologi Publik  
Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda Sumba Timur  
BulanOktober2018**

N O	Jenis Publikasi	Unit Kerja	INSTANSI PENERIMA PUBLIKASI			
			DI LINGKUNGAN BMKG		DI LUAR BMKG	
			UNIT KERJA	JML	UNIT KERJA	JML
1	2	3	4	5	6	7
1	Data Klimatologi	Stamet Umbu Mehang Kunda Sumba Timur	Deputi bidang meteorologi Kepala Balai BMKG Wil.III Koord. BMKG NTT Ka. Stasiun Lasiana Kupang	1 lbr Sda Sda Sda	-	- -
2	Buletin Informasi Meteorologi	Sda	Sestama BMKG Deputi Bdg. Meteorologi Stamet, Staklim, Stageof se NTT	1 Exp Sda Sda	Bupati Sumba Timur Dinas Pertanian Sumba Timur dll	1 Exp Sda
3	QAM	Sda		-	Bandar Umbu Mehang Kunda	307
4	METAR	Sda	BMKG Via CMSS	720	-	-
5	SPECI	Sda	BMKG Via CMSS	40	-	-

### III. INFORMASI CUACA BERMAKNA

Dalam ilmu Meteorologi badai guntur dikenal dengan istilah TS atau Thunderstorm. Badai guntur biasanya terjadi saat munculnya awan Cumulonimbus ( CB ). Awan Cumulonimbus (Cb) adalah awan Cumulus yang besar terbentuk seperti bunga kol dan menjulang tinggi sebagai awan hujan yang di sertai angin kencang. Dasar awan Cumulonimbus (Cb) sekitar 100 – 600 meter, sedangkan puncaknya mencapai ketinggian sampai kurang lebih 20 km.

Dalam awan Cumulonimbus dapat terjadi batu es ( hail ), guruh, kilat, hujan deras dan kadang – kadang terjadi angin puting beliung. Adapun fenomena cuaca yang sering ditimbulkan oleh awan Cumulonimbus ( Cb ) antara lain : Petir, Puting Beliung dan Hujan Es.

- **Petir** adalah lompatan bungan api listrik raksasa antara dua masa yang mempunyai perbedaan medan listrik. Petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi dari pelepasan itu begitu besarnya sehingga menimbulkan rentetan cahaya, panas dan bunyi yang sangat kuat yaitu guntur atau halilintar. Karena sedemikian besarnya ketika petir itu melesat, tubuh awan akan terang benderang di buatnya sebagai akibat udara yang terbelah.

- **Hujan es dan angin puting beliung** berasal dari awan bersel tunggal berlapis – lapis (Cumulonimbus ) yang dekat dengan permukaan bumi. Dapat juga berasal dari multi sel awan. Pertumbuhannya vertikal dengan luasan area horizontal sekitar 3 – 5 km atau lebih. Jadi wajar kalau peristiwa ini bersifat local dan tidak merata. Jenis awan berlapis – lapis ini menjulang kearah vertikal sampai dengan ketinggian 30.000 feet lebih. Jenis awan berlapis – lapis ini biasanya berbentuk bunga kol.

data TS dan RA yang terjadi Selama bulan Oktober2018



# SIKLON TROPIS

## Apakah Siklon Tropis itu ?

Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat, lebih dari 26.5 °C. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km/jam.

Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya enam jam.



Perbandingan ukuran Typhoon Tip (1979)  
dan Siklon Tropis Tracy (1977)

Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah dimana terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terbesar.

Masa hidup suatu siklon tropis rata-rata berkisar antara 3 hingga 18 hari. Karena energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau memasuki daratan.

Siklon tropis dikenal dengan berbagai istilah di muka bumi, yaitu "badai tropis" atau "typhoon" atau "topan" jika terbentuk di Samudra Pasifik Barat, "siklon" atau "cyclone" jika terbentuk di sekitar India atau Australia, dan "hurricane" jika terbentuk di Samudra Atlantik.

#### Kecepatan Angin Maksimum

Yang dimaksud dengan kecepatan angin maksimum adalah angin permukaan rata-rata 10 menit tertinggi yang terjadi di dalam wilayah sirkulasi siklon. Angin dengan kecepatan tertinggi ini biasanya terdapat di wilayah cincin di dekat pusat siklon, atau jika siklon ini memiliki mata, berada di dinding mata.

#### Ukuran Siklon Tropis

Ukuran siklon tropis menyatakan diameter wilayah yang mengalami gale force wind. Ukuran siklon tropis bervariasi. mulai dari 50 km (Cyclone Tracy, 1977) hingga 1100 km (Typhoon Tip, 1979).

Daerah pertumbuhan siklon tropis mencakup Atlantik Barat, Pasifik Timur, Pasifik Utara bagian barat, Samudera Hindia bagian utara dan selatan, Australia dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di belahan bumi bagian utara. Sekitar 65% siklon tropis terbentuk di daerah antara  $10^{\circ}$  -  $20^{\circ}$  dari ekuator, hanya sekitar 13% siklon tropis yang tumbuh di atas daerah lintang  $20^{\circ}$ , sedangkan di daerah lintang rendah ( $0^{\circ}$  -  $10^{\circ}$ ) siklon tropis jarang terbentuk.

## Daerah Pertumbuhan

Daerah pertumbuhan siklon tropis dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah. Ini mencakup wilayah lautan di seluruh dunia.



<b>Nomor</b>	<b>Nama Daerah Pertumbuhan</b>	<b>Luasan Wilayah</b>
1	Atlantik Utara	Samudra Atlantik Utara, Laut Karibia dan Teluk Meksiko
2	Pasifik Timur Laut	Amerika Utara hingga 180° BT
3	Pasifik Barat Laut	Sebelah Barat 180° BT, termasuk Laut Cina Selatan
4	Hindia Utara	Teluk Benggala dan Laut Arab
5	Hindia Selatan	Samudra Hindia Selatan sebelah Barat 100° BT
6	Hindia Tenggara / Australia	Bumi Belahan Selatan 100 - 142° BT
7	Pasifik Barat Daya / Australia	Bumi Belahan Selatan sebelah Timur 142° BT

